




Reconstrucción Acromioclavicular

Técnica quirúrgica




Reconstrucción acromioclavicular, técnica quirúrgica


IMPLANT




Identificar mediante tacto, la coracoides y el borde anterior de la clavícula. Realizar un abordaje con una incisión centrada en la ubicación de la coracoides.




Atravesar el mango FlipH por el orificio perforado en ambos huesos hasta identificar mediante RX que la totalidad del endobutton haya atravesado la coracoides.




Accionar el botón de acción pulsándolo con el pulgar hasta topar con el mango. Retirar el mango y tensionar las suturas para asegurarse de que el endobutton haya bloqueado correctamente.



Realizar una perforación a través de la clavícula y la coracoides con broca ø4 mm.



Remover el seguro del botón de acción empujándolo desde las pestañas.



Con una mano sostener el loop de sutura y con la otra bajar el segundo endobutton hasta apoyarlo en la clavícula. Utilizando los tensores, tirar de las suturas flotantes de a una intercalando para ajustar el loop hasta darle la tensión deseada al sistema. De ser requerido, realizar hasta 3 nudos de seguridad y cortar las suturas flotantes.

Implante


Doble endobutton FlipH



01 - 005 - 12


Instrumental específico

Broca ø4 mm



60 - 297

La presente técnica es una herramienta de educación y orientación para el médico y/o personal de salud que desee realizar la cirugía. Los profesionales médicos deberán utilizar sus conocimientos en el campo y su experiencia para poder implementarla correctamente, así como también ser capaces de llevar adelante un seguimiento post-operatorio del paciente.



Pueyrredón 1093
Córdoba, Argentina. C.P.:X5000CQA
Tel: +54 351 4601050
implant@implantca.com

www.implantca.com.ar